

Algemeen schema van de aanbevolen vaccinaties

September 2020

Vaccinatie tegen	8 weken	12 weken	16 weken	12 maanden	15 maanden ⁽¹⁾	5-7 jaar	10-13 jaar ⁽⁴⁾	14-16 jaar
Poliomyelitis								
Difterie (kroep)								
Tetanus (klem)								
Pertussis (kinkhoest)								
Haemophilus Influenzae B (hersenvliesontsteking)								
Hepatitis B (geelzucht)								
Pneumokokken ⁽¹⁾ 13-serotypes								
Rotavirus ⁽²⁾								
Mazelen								
Bof (dikoor)								
Rodehond (rubella)								
Meningokokken type C of ACWY ⁽³⁾ (hersenvliesontsteking)								
Humaan Papillomavirus ⁽⁴⁾								

gratis

niet gratis

combinatievaccin: 1 spuitje

Speciale aandachtspunten :

Kind en Gezin beveelt sterk aan om dit volledig schema toe te passen, voorgesteld door de Hoge Gezondheidsraad van België. Wettelijk is enkel de poliovaccinatie verplicht.

Voor de toediening van een vaccin heb je de vrije keuze tussen het consultatiebureau van Kind en Gezin, je huisarts of kinderarts.

Naast de vaccins uit dit basisschema bestaan er nog andere vaccins die je kan geven voor de individuele bescherming van je kind, bv. tegen meningokokken B, windpokken en hepatitis A. Raadpleeg hiervoor je behandeld arts.

(1) Bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken:

- Wordt er een extra dosis tegen pneumokokken toegediend op de leeftijd van 12 weken.
- Worden de vaccins van 15 maanden vervroegd naar 13 maanden.

(2) Het rotavirusvaccin kost ongeveer € 12, op doktersvoorschrift. In de koelkast bewaren (2-8°C). Er zijn 2 of 3 dosissen nodig, afhankelijk van het merk.

(3) De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie tegen meningokokken ACWY aan, in plaats van enkel tegen meningokokken C. Het ACWY-vaccin kost ongeveer € 53, op doktersvoorschrift. In de koelkast bewaren (2-8°C).

(4) 1ste jaar secundair onderwijs. 2 dosissen met een interval van 6 maanden.